



Traitement Dentaire Urgent Pour Les Sports



Un protecteur buccal fabriqué par un professionnel dentaire est conseillé lorsque l'on pratique des sports de contact. À tout plus d'informations, veuillez visiter le site www.americanacademy-sportsdentistry.com

AVULSION (Dent entièrement ou partiellement hors de la bouche et décolorée)

- Évitez tout autre traumatisme à la dent lorsque vous le portez. **75.000** pour la dent perdue/racine. **75.000** pour la dent, le racine et **25.000** pour la dent.
- Si possible, réinsérer la dent en position et stabiliser la dent en déplaçant à la personne de manière décolorée sur une serviette ou un mouchoir. Suivre votre dentiste seulement si l'athlète est conscient et capable.
- Si incapable de le réinsérer:
 - Meilleure option - placer la dent dans une solution de "New's Esthetic Endo Solution".
 - Deuxième meilleure option - placer la dent dans de l'eau froide.
 - Troisième meilleure option - placer la dent dans un verre rempli de salive.
 - Quatrième meilleure option - placer la dent sous la langue ou l'athlète. Suivre votre dentiste SEULEMENT si l'athlète est conscient et capable.
 - Cinquième meilleure option - placer la dent dans une tasse d'eau.
- Évitez tout contact avec les autres dents. Afin de réinsérer la dent, le professionnel aura de meilleures chances de réussite si la procédure est faite en l'espace de 30 minutes. **RENDEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT CHEZ UN DENTISTE.**

LUXATION (Dent encore insérée dans la maxillaire position)

TROIS POSITIONS

DENT EXTRUSE - Dent qui s'est déplacée vers le bas et/ou la dent du bas est insérée.

- Repositionner la dent avec les doigts en exerçant une pression ferme.
- Garder la dent en place en maintenant sur une serviette ou un mouchoir.
- RENDEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT CHEZ UN DENTISTE.**

DEPLACEMENT LATÉRAL - Dent poussée vers l'arrière ou vers le devant.

- Essayez de repositionner la dent en utilisant les doigts en exerçant une pression ferme.
- L'athlète pourrait nécessiter de l'anesthésie afin de repositionner la dent. Advisez que ce est le cas, veuillez réinsérer la dent en maintenant sur une serviette ou mouchoir.
- RENDEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT CHEZ UN DENTISTE.**

DENT INTRUSE - Dent poussée vers le gingive et apparaît court.

- Ne touchez rien. Évitez de repositionner la dent.
- RENDEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT CHEZ UN DENTISTE.**

FRAGILITÉ - "Craquelé"

- Si la dent est complètement cassée en deux, garder la pulpe racinaire et ramener tout ce qui est resté comme dent et racine, dans 4. Garder en place le plus de dents en contact avec la bouche en maintenant sur une serviette ou un mouchoir de réinsérer le segment.
- Si il n'y a pas de douleur extrême, éviter le contact avec les autres dents. Faire un dentiste. La pulpe pourrait nécessiter de l'anesthésie afin d'être réinsérée dans la dent.
- RENDEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT CHEZ UN DENTISTE AVEC TOUTES LES PIÈCES DE LA DENT.**

American Academy for Sports Dentistry

118 Faye Street

P.O. Box 364

Farmersville, IL 62331

USA

217-275-3431

www.sportsdentistry-usd.org



1. Recherchez pour tout dentiste de sports dentaire pour le support de la dent. Si la dent est cassée, contactez votre dentiste pour le support de la dent. Contactez votre dentiste pour le support de la dent. Si la dent est cassée, contactez votre dentiste pour le support de la dent. Si la dent est cassée, contactez votre dentiste pour le support de la dent.

**UN PROTECTEUR BUCCAL CORRECTEMENT ADAPTÉ
DEVRAIT ÊTRE UN ÉQUIPEMENT STANDARD**